


## Aufgabe 5 GPS

Eine Person bestimmt ihre Position auf der Erdoberfläche mit Hilfe eines GPS-Gerätes. Dieser Vorgang soll in dieser Aufgabe prinzipiell nachvollzogen werden.

Wir machen dazu folgende vereinfachende Annahmen:

- Die Erde ist eine ideale Kugel mit einem Umfang von 40 000 km und dem zugehörigen Radius von  $R = 6\,366$  km. Als Längeneinheit wählen wir gerade diesen Erdradius.
- Weiterhin betrachten wir folgendes erdgebundene Koordinatensystem:  
Der Koordinatenursprung ist der Erdmittelpunkt. Die  $x_3$ -Achse liegt auf der Erdachse und zeigt zum Nordpol. Der Nordpol ist also der Einheitspunkt auf der  $x_3$ -Achse mit den Koordinaten  $(0 | 0 | 1)$ .  
Die  $x_1$ -Achse geht durch den Schnittpunkt von Äquator und Nullmeridian, dieser Punkt mit den geographischen Koordinaten  $0^\circ$  Breite und  $0^\circ$  Länge ist der Einheitspunkt auf der  $x_1$ -Achse, hat also die Koordinaten  $(1 | 0 | 0)$ .  
Der Einheitspunkt auf der  $x_2$ -Achse hat dann  $0^\circ$  Breite und  $180^\circ$  östliche Länge und die Koordinaten  $(0 | 1 | 0)$ .
- Zu einem genau fixierten Zeitpunkt der Positionsbestimmung empfängt die Person mit ihrem GPS-Gerät von zwei GPS Satelliten deren genaue Positionen  $Sat_1$  und  $Sat_2$  in dem genannten rechtwinkligen Koordinatensystem. Außerdem empfängt der GPS-Empfänger die genaue Uhrzeit in den Satelliten zum Zeitpunkt der Aussendung der Signale. Aus der Zeitdifferenz der beiden Uhren in den Satelliten und im GPS-Empfänger zum Empfangszeitpunkt kann dieser (mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit) die Entfernungen  $d_1$  und  $d_2$  von seiner unbekannt Position zu den beiden Satelliten berechnen. (Dies ist in Wirklichkeit wegen der Ungenauigkeit der Empfängeruhr komplizierter!).



### Nun zur eigentlichen Aufgabe:

Es sei  $Sat_1 (2 | 2 | 3)$  und  $d_1 = 3,2$  und ebenso  $Sat_2 (3 | 2 | 2)$  und  $d_2 = 3,3$ .

- a) Beschreiben Sie den prinzipiellen Weg, wie man den Standort der Person aus den gegebenen Daten berechnen kann.
- b) Betrachten Sie die Kugel um  $Sat_1$  mit dem Radius  $d_1$  und geben Sie die Gleichung der Kugeloberfläche an.  
Diese Kugeloberfläche schneidet die Erdoberfläche in einem Schnittkreis. Berechnen Sie eine Koordinatengleichung der Ebene, in der dieser Schnittkreis liegt.
- c) Die gleiche Rechnung wie in b) für die Kugel um  $Sat_2$  mit dem Radius  $d_2$  ergibt die folgende Gleichung für die Schnittkreisebene:  $E_2: 600x + 400y + 400z = 711$ .  
Bestimmen Sie die Schnittgerade der beiden Ebenen  $E_1$  und  $E_2$  in der Parameterform.
- d) Beschreiben Sie, wie man aus den bisherigen Daten die Koordinaten von zwei Punkten ermitteln kann, von denen einer der Standort der Person sein muss.
- e) Die Person weiß immerhin, dass sie sich in Nordeuropa aufhält. So kann sie aus den berechneten beiden Punkten den für sie zutreffenden Punkt auswählen:  $Pos (57,3^\circ | 17,5^\circ)$ .  
Bestimmen Sie die Länge des kürzesten Weges auf der Erdoberfläche von Hamburg ( $53,5^\circ | 10^\circ$ ) zum Standort  $Pos$  der Person.

## Aufgabe 5 GPS

	Lösungsskizze	Zuordnung, Bewertung		
		I	II	III
a)	<p>Aus den als bekannt vorausgesetzten Informationen geht hervor, dass sich die Person gleichzeitig auf der Oberfläche von drei Kugeln befinden muss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Erdkugel</li> <li>• der Kugel um <math>Sat_1</math> mit dem Radius <math>d_1</math> und</li> <li>• der Kugel um <math>Sat_2</math> mit dem Radius <math>d_2</math>.</li> </ul> <p>Wenn die Daten realistisch sind, dann müssen sich die Erdoberfläche und jede der beiden anderen Kugeloberflächen jeweils in einem Kreis schneiden, den man berechnen kann. Die beiden Schnittkreise schneiden sich dann in zwei Punkten, die man dann auch berechnen kann und die in der Regel weit voneinander entfernt liegen, so dass man aus der grob ungefähren Kenntnis des Standortes der Person einen von beiden ausschließen kann.</p>		25	
b)	<p>Es sei <math>P(x_1   x_2   x_3)</math> ein variabler Punkt. Die Kugelgleichung lautet dann:</p> $(\vec{p} - \overrightarrow{sat_1})^2 = d_1^2, \text{ also } (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_3 - 3)^2 = 3,2^2.$ <p>Für die Erdoberfläche gilt:</p> $P^2 = 1, \text{ also } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1.$ <p>Subtraktion dieser beiden Gleichungen ergibt:</p> $4x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 17 = -\frac{231}{25}.$ <p>Durch Multiplikation der Gleichung mit 25 erhält man das genannte Ergebnis:</p> $100x_1 + 100x_2 + 150x_3 = 194.$ <p>Es handelt sich um eine Ebenengleichung. Alle gemeinsamen Punkte auf den beiden Kugeloberflächen müssen diese Gleichung erfüllen (Umkehrung gilt nicht!), also muss es sich um die Ebene des Schnittkreises handeln.</p>	20		
c)	<p>Wenn man das unterbestimmte lineare Gleichungssystem</p> $100x_1 + 100x_2 + 150x_3 = 194$ $600x_1 + 400x_2 + 400x_3 = 711$ <p>äquivalent umformt (Gauß-Algorithmus) erhält man z.B.</p> $x_2 = \frac{581}{400} - \frac{5}{2}x_1 \quad x_3 = \frac{13}{40} + x_1$ <p>Daraus erhält man folgende Parameterform der Schnittgeraden der beiden Schnittkreisebenen:</p> $g: \vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{581}{400} \\ \frac{13}{40} \\ 40 \end{pmatrix} + x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2,5 \\ 1 \end{pmatrix}.$		20	

	Lösungsskizze	Zuordnung, Bewertung		
		I	II	III
d)	<p>Der Standort der Person muss sowohl auf dieser Geraden, als auch auf der Erdoberfläche liegen. Das führt auf folgende quadratische Gleichung:</p> $\left( \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{581}{400} \\ \frac{13}{40} \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{5}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right)^2 = 1.$ <p>Die Gleichung oder ein anderer zutreffender Ansatz kann auch verbal beschrieben werden.</p>			10
e)	<p>Mit der Umrechnung <math>(\beta ; \lambda) \rightarrow (\cos(\beta) \cdot \cos(\lambda) \mid \cos(\beta) \cdot \sin(\lambda) \mid \sin(\beta))</math> berechnen wir die Koordinaten von Hamburg</p> $H = (\cos 53,5^\circ \cdot \cos 10^\circ \mid \cos 53,5^\circ \cdot \sin 10^\circ \mid \sin 53,5^\circ)$ $\approx (0,58579 \mid 0,10329 \mid 0,80386)$ <p>und der Position <i>Pos</i></p> $Pos = (\cos 57,3^\circ \cdot \cos 17,5^\circ \mid \cos 57,3^\circ \cdot \sin 17,5^\circ \mid \sin 57,3^\circ)$ $\approx (0,51524 \mid 0,16245 \mid 0,84151).$ <p>Sowohl <i>H</i> als auch <i>Pos</i> liegen auf der Erdoberfläche, haben also in dem gewählten Maßstab den Betrag 1. Mit Hilfe des Skalarproduktes berechnet man den sphärischen Winkel:</p> $\sphericalangle H O Pos \approx \cos^{-1} \left( \begin{pmatrix} 0,58579 \\ 0,10329 \\ 0,80386 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,51524 \\ 0,16245 \\ 0,84151 \end{pmatrix} \right) \approx \cos^{-1}(0,99506) \approx 5,7^\circ.$ <p>Für die zugehörige Bogenlänge auf der Erdoberfläche gilt dann:</p> $b \approx \frac{5,7}{360} \cdot 40\,000 \approx 633.$ <p>Die kürzeste Weglänge auf der Erdoberfläche von Hamburg zur Position der Person beträgt etwa 633 km.</p>		15	10
	Insgesamt 100 BWE	20	60	20