

Aufgabe 2 ohne CAS


Start einer Silvesterrakete

Eine Silvesterrakete wird senkrecht vom Erdboden in den Nachthimmel geschossen.

Der Treibsatz brennt in 4 s (Sekunden) ab, d.h. die Rakete wird in diesem Moment nicht mehr beschleunigt. Nachdem der Treibsatz ausgebrannt ist, nimmt die Geschwindigkeit der weiterhin senkrecht aufsteigenden Rakete innerhalb von 2 s linear auf $0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ im höchsten Punkt ab.

Der gesamte Geschwindigkeitsverlauf für den Aufstieg der Rakete

ist im nebenstehenden Diagramm idealisiert dargestellt.



- Bestimmen Sie anhand des Diagramms, wann die Rakete ihre maximale Geschwindigkeit und wann sie ihre maximale Flughöhe erreicht.
Geben Sie begründet einen ungefähren Wert für die maximale Flughöhe an.
- Ermitteln Sie Funktionsterme zur Beschreibung der Raketengeschwindigkeit für die beiden Zeitabschnitte $0 \text{ s} \leq t \leq 4 \text{ s}$ und $4 \text{ s} \leq t \leq 6 \text{ s}$.
- Bestimmen Sie rechnerisch in welche maximale Höhe über dem Erdboden die Rakete aufsteigt.

Erwartungshorizont zur Aufgabe 2 "Silvesterrakete" – ohne CAS

Skizzierung der Lösung	Anforderungsbeschreibung	TR	Punkte
Teil a):			
<p>Die Raketengeschwindigkeit ist nach Abbrennen des Treibsatzes maximal, also nach 4s. Die größte Flughöhe erreicht die Rakete wenn ihre Geschwindigkeit wieder auf 0 abgenommen hat, also nach 6s. Schätzwert für die maximale Flughöhe: z.B. $(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 15 + 2 \cdot 17,5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20) \text{ m} = 70 \text{ m}$ als Flächeninhalt zwischen dem Graphen und der ersten Achse.</p>	<p>Schülerinnen und Schüler interpretieren den Graphen und identifizieren den Flächeninhalt zwischen dem Graphen und der ersten Achse als Wegstrecke. Schülerinnen und Schüler approximieren den Flächeninhalt durch geeignete Zerlegungen.</p>		4
Teil b):			
<p>Für $0 \text{ s} \leq t \leq 4 \text{ s}$: Die Gleichung der Parabel mit dem Scheitelpunkt $(4 20)$, die durch den Ursprung verläuft lautet: $v_1(t) = -1,25t^2 + 10t$ Für $4 \text{ s} \leq t \leq 6 \text{ s}$: Mit den Punkten $(4 20)$ und $(6 0)$ ergibt sich als lineare Funktion: $v_2(t) = -10t + 60$.</p>	<p>Anhand markanter Punkte des Graphen modellieren die Schülerinnen und Schüler eine quadratische Funktion für den ersten und eine lineare Funktion für den zweiten Zeitabschnitt.</p>		8

Skizzierung der Lösung	Anforderungsbeschreibung	TR	Punkte
Teil c):			
<p>Für $0s \leq t \leq 4s$:</p> $s_1 = \int_0^4 (-1,25t^2 + 10t) dt = \left[-\frac{5}{12}t^3 + 5t^2 \right]_0^4 = 53\frac{1}{3}$ <p>Für $4s \leq t \leq 6s$:</p> $s_2 = \int_4^6 (-10t + 60) dt = \left[-5t^2 + 60t \right]_4^6 = 20$ <p>Insgesamt steigt die Rakete in eine Höhe von</p> $s_{ges} = 53\frac{1}{3}m + 20m = 73\frac{1}{3}m .$	<p>Schülerinnen und Schüler berechnen das bestimmte Integral für beide Zeitabschnitte.</p>	<p>Numerische Berechnungen</p>	<p>6</p>

Gesamt: 18 Punkte